

Kontakt:

Tumorzentrum Hirslanden Zürich
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich
T +41 44 387 96 62
tumorzentrum.hirslanden@hirslanden.ch

HIRSLANDEN

TUMORZENTRUM HIRSLANDEN ZÜRICH



offene Studien

Mammakarzinom

Studienname

ELEANOR (Pierre Fabre)-Studie
eMonarchHER (Lilly)-Studie
EPIK-Trial (Novartis)
EXPERT- Studie (ANZ 1601/ BIG 16-02)
IMPASSION 030-Studie (BIG 16-05)
OGIPRO-Studie
OPBC-02/ PREPEC-Studie
POLAR-Studie (IBCSG 59/19)
TARGIT B -Studie (UCL London)
TAXIS-Studie (SAKK 23/16)
TOUCH-Studie (IBCSG 55-17)
VISION-Studie (SAKK 23/18) (temporary closed)

Zielgruppe/ Kurzbeschreibung

Neratinib für 1 Jahr bei HR+, HER2+ PatientInnen < 1 Jahr nach Abschluss der HER2+ Pat. mit EBC
ET + Abemaciclib vs. ET+ Placebo bei high risk, nodal positiven, HR+, HER2+ Pat. mit EBC
Alpelisib/ Nab-Paclitaxel in advanced TNBC (Efficacy and safety of alpelisib (BYL719) in combination with nab-paclitaxel in patients with advanced triple negative breast cancer PIK3CA mutation or PTEN loss without PIK3CA mutation).
Adjuvante Radiotherapie versus Beobachtung bei brusterhaltender und endokriner Therapie von PatientInnen mit molekular bestimmten Luminal A-Mammakarzinom
Atezolizumab (Anti-PD-L1-AK) in Kombination mit adjuvanter Chemotherapie (Anthrazykline/Taxane based) vs. Adjuvanter Chemotherapie allein bei operablem Triple-negativem Mammakarzinom
bereits vorhandene Daten werden bezüglich Wirksamkeit, NW und Wohlbefinden von Behandlungen mit HerceptinTM (Referenz-Medikament) mit neu gewonnenen Daten von Therapien mit dem Biosimilar OgivriTM verglichen (APP-Erfassung).
Pre- versus sub-pectoral implant-based breast reconstruction after skinsparing mastectomy or nipple-sparing mastectomy (OPBC-02/ PREPEC)// Prä-versus subpectorale Implantat-Brustrekonstruktion bei Skin Sparing oder Nipple-Sparing Mastektomie
Palbociclib bei HR-positivem / HER2-negativem, isoliertem, lokoregionärem Brustkrebs-Rezidiv
Radiotherapie-Studie: Boost intraoperativ vs. konventioneller Boost
Gezielte versus radikale axilläre Lymphknotenoperation gefolgt von Radiotherapie bei PatientInnen mit axillären Lymphknotenmetastase(n)
Neoadjuvant Palbociclib in Kombination mit Letrozol und dualer Her2-Blockade vs. Paclitaxel in Kombination mit dualer Her2-Blockade für ältere PatientInnen > 65 Jahre mit hormonsensitivem, Her2-negativem frühem Mammakarzinom.
Vacuum assisted biopsy Immediately before Surgery as an Intra- or pre-Operative surrogate for patient response to Neoadjuvant chemotherapy for breast cancer (VISION I)

Urogenitale Tumore

PCO Studie (Prostate Cancer Outcome)
Roche GLYCART Studie

Messung der Lebensqualität von Patienten mit Prostatakarzinom mit einem weltweit einheitlichen Patientenfragebogen
Ex vivo Model von frischem Tumorgewebe

Gastrointestinale Tumore

EDIUM Studie
Roche GLYCART Studie
Qualitätssicherung Duodenaltumoren
Qualitätssicherung Pankreaskarzinom
Barret-CAD Studie
ESODATA Studie
PREFER-Studie
ROBOT-2 Studie
Tiger Studie

Patient-reported outcome study Darmkrebs Patienten: Ergebnisqualität bei Darmkrebs: Identifikation von Unterschieden und Massnahmen zur flächendeckenden Qualitätsentwicklung
Ex vivo Model von frischem Tumorgewebe
Qualitätssicherung der perioperativen Morbidität und des postoperativen Follow up nach Eingriffen im hepato-duodeno-pankreatischen Gebiet
Qualitätssicherung der perioperativen Morbidität und des postoperativen Follow up nach Pankreasresektionen
Data collection for computer aided detection of Barrett neoplasia
International standardized online database for outcomes of the patients receiving evaluation and/ or treatment für esophageal diseases of benign and malignant conditions
Endoscopic management of patients with T1bN0M0 esophageal adenocarcinoma
Robot-assisted minimally invasive thoraco-laparoscopic esophagectomy versus minimally invasive esophagectomy for resectable esophageal adenocarcinoma, a randomized controlled trial
Distribution of lymph node metastases in esophageal carcinoma

Hämatologische Tumore

Abbvie Valor-Studie
EBMT-Register
PASS-Studie
SAKK EMCL-Registry (temporary closed)

Studie für Patienten mit neu diagnostizierter AML, welche 1st line mit Venetroclax behandelt werden.
Register für Patienten welche eine Blutstammzelltransplantation oder eine andere Zelltherapie (z.B. CAR-T-Zelltherapie)
Einschluss von Patienten mit CAR-T Behandlung, Beobachtungsstudie zur Behandlung und Komplikationen
The Registry of the European Mantle Cell Lymphoma study group - MCL: Disease pattern, treatment algorithms and mechanisms of relapse

Neuroonkologische Tumore

PERGOLA-Studie
Meningjom-Studie

Pembrolizumab for newly diagnosed glioblastoma: a prospective, open-label, single-arm, multicenter phase II study
A population-based study on incidence, survival and molecular characteristics of meningioma in the Canton of Zurich, Switzerland

Gynäkologische Tumore

ePro-Studie
MATAO-Studie
Roche GLYCART Studie

Outcomes and Quality of Life using PROM and patient-centered data storage-an observational Study
Maintenance Therapy with Aromatase inhibitor in epithelial Ovarian cancer: a randomized double-blinded placebo-controlled multi-center phase III Trial
Ex vivo Model von frischem Tumorgewebe