Audit 2023

Kontakt:

Tumorzentrum Hirslanden Zürich
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich
T +41 44 387 96 62
tumorzentrum.hirslanden@hirslanden.ch

offene Studien

Mammakarzinom

Studienname	Zielgruppe/ Kurzbeschreibung
CanOn Studie	Patientenregister für Cannabis in der Onkologie.
ELEANOR (Pierre Fabre)-Studie	Neratinib bei Patienten mit HER2+ Brustkrebs: eine multizentrische, multinationale, prospektive, longitudinale, nicht-interventionelle Studie für Patienten mit HR-positiven, HER2-ampflifzierten Brustkrebs (stage I-III), welche eine adjuvante Trastuzumab Therapie vor weniger als einem Jahr hatten.
EXPERT- Studie (ANZ 1601/ BIG 16-02)	Adjuvante Radiotherapie versus Beobachtung bei brusterhaltender und endokriner Therpaie von PatientInnen mit molekular bestimmten Luminal A-Mammakarzinom.
HER2CLIMB-05 (Seagen)	Tucatinib oder Placebo in Kombination mit Trastuzumab und Pertuzumab als Erhaltungstherapie bei metastatischem HER2+ Brustkrebs.
IMPASSION 030-Studie (BIG 16-05)	Atezolizumab (Anti-PD-L1-AK) in Kombination mit adjuvanter Chemotherapie (Anthrazykline/Taxane based) vs. Adjuvanter Chemotherapie allein bei operablem Triple-negativem Mammakarzinom.
LidERA-Studie (Roche G042784)	Adjuvante endokrine Therapie mit Giredestrant (oral SERD) vs. endokrine Therapie der Wahl für 5 Jahre bei HR+, HER2- PatientInnen mit EBC.
OGIPRO-Studie	Bereits vorhandene Daten werden bezüglich Wirksamkeit, Nebenwirkungen und Wohlbefinden von Behandlungen mit HerceptinTM (Referenz-Medikament) mit neu gewonnenen Daten von Therapien mit dem Biosimilar OgivriTM verglichen (APP-Erfassung).
POLAR-Studie (IBCSG 59/19)	Palbociclib bei HR-positivem / HER2-negativem, isoliertem, lokoregionärem Brustkrebs-Rezidiv.
SASCIA-Studie (Gilead)	Phase III postneoadjuvante Studie zur Beurteilung von Sacituzumab Govitecan bei primärem HER2-negativem Brustkrebs mit erhöhtem Rezidivrisiko (inkomplette path. Remission) nach Standard neoadjuvanter Chemotherapie.
SERENA 4-Studie (Astra Zeneca)	Eine randomisierte, doppelblinde Phase-3-Studie zu AZD9833 plus Palbociclib im Vergleich zu Anastrozol plus Palbociclib bei Patienten mit Östrogenrezeptor-positivem HER2-negativem Mammakarzinom, die bisher keine systemische Behandlung der fortgeschrittenen Erkrankung erhalten haben (SERENA-4).
TAXIS-Studie (SAKK 23/16)	Gezielte versus radikale axilläre Lymphknotenoperation gefolgt von Radiotherapie bei Patientinnen mit axillären Lymphknotenmetastase(n).
VISION-Studie (SAKK 23/18)	Vakuum-assistierte Biopsie vor Tumoroperation als intra- oder präoperativer Ersatz für Patienten mit Brustkrebs bei nach einer neoadjuvanten Chemotherapie mittels MRT kein oder fast kein Tumorgewebe mehr nachweisbar ist (VISION I).

Urogenitale Tumore	PCO Studie (Prostate Cancer Outcome)	Messung der Lebensqualität von Patienten mit Prostatakarzinom mit einem weltweit einheitlichen Patientenfragebogen.
	Ironman Studie	Internationales Register für Männer mit fortgeschrittenem Prostatakrebs, welches Informationen die Art des Krebses, die Behandlung und Nebenwirkungen der Behandlungen sammelt.
	Roche GLYCART Studie	Ex vivo Model von frischem Tumorgewebe.
	SAKK 06/ 19	Multizentrische, singel-arm Phase II Studie: Peroperative Behandlung mit BCG / Postoperative Immuntherapie in Kombination mit Standardchemotherapie bei Patienten mit operablem Karzinom des Harntrakts.
Gastrointestinale Tumore	EDIUM Studie	Patient-reported outcome study Darmkrebs Patienten: **E**rgebnisqualität bei **D**armkrebs: **I**dentifikation von **U**nterschieden und **M**assnahmen zur flächendeckenden Qualitätsentwicklung
	ESODATA Studie	International standardisierte online Datenbank (PROMs) für Patienten mit benignen und malignen Speiseröhrenerkrankungen.
	Patient-derived organoid generation Study	PDOs (Patient-derived organoid) bei Pankreaskrebs: eine offene, single-centre, einarmige, offene Machbarkeitsstudie.
	PREFER-Studie	Prospetkive endoskopische Nachsorge von Patienten mit T1bN0M0 ösophagealem Adenokarzinom.
	Qualitätssicherungstudie Duodenaltumore	Qualitätssicherung der perioperativen Morbidität und des postoperativen Follow up nachEingriffen im hepato-duodeno-pankreatischen Gebiet.
	Qualitätssicherungstudie Pankreaskarzinom	Qualitätssicherung der perioperativen Morbidität und des postoperativen Follow up nach Pankreasresektionen.
	ROBOT-2 Studie	Roboterassistierte Ösophagektomie im Vergleich zur konventionellen thorakoskopischen Ösophagektomie (RAE vs CTE) bei Patienten mit Plattenepithelkarzinom des Ösophagus.
	Roche GLYCART Studie	Ex vivo Model von frischem Tumorgewebe.
	Tiger Studie	Verteilung von Lymphknotenmetastasen beim Ösophaguskarzinom (TIGER).
Hämatologische Tumore	Abbvie Valor-Studie	Studie für Patienten mit neu diagnostizierter AML, welche 1st line mit Venetroclax behandelt werden.
	CAR-T Cell e-Pro Studie	Studie zur Symptomerfassung via App - Pilotprojekt für Patienten die CAR-T-Cell Therapie erhalten
	EBMT-Register	Register für Patienten welche eine Blutstammzelltransplantation oder eine andere Zelltherapie (z.B. CAR-T-Zelltherapie)
	PASS-Studie	Einschluss von Patienten mit CAR-T Behandlung, Beobachtungsstudie zur Behandlung und Komplikationen
	SAKK EMCL-Registry	Europäisches Mantelzelllymphom-Register: statistische Erhebung von Diagnose, Therapie-und Therapieansprechen und Krankheitsverlauf und Rezidiv-Auftreten.
Neuroonkologische Tumore	Gliostar Studie	Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit des Antikörper-Cytokin-Fusionsproteins L19TNF in Kombination mit Lomustin bei Patienten mit Glioblastom im ersten Rezidiv
	Meningiom-Studie	Bevölkerungsstudie zum Auftreten, Überleben und den molekluaren Charakteristika bei Meningiomen im Kanton Zürich, Schweiz.
	PERGOLA-Studie	Pembrolizumab für neu diagnostiziertes Glioblastom: eine prospektive, offene, einarmige, multizentrische Phase-II Studie.

Gynäkologische Tumore	ePro-Studie	Observationsstudie zur Messung der Resultate und Lebensqualität bei Patienten, die ein elektronisches Patienten-Reporting benutzen.
	MATAO-Studie	**MATAO- MA**intenance **T**herapie mit **A**romatasehemmer (Letrozol) für Patientinnen mit epithelialem **O**varialkarzinom: Eine randomisierte doppel-blinde Placebo-kontrollierte Phase III Studie inklusive LOGOS (LOw Grade Ovarian cancer Sub-study).
	Roche GLYCART Studie	Ex vivo Model von frischem Tumorgewebe