

MEDIKAMENTE PERIPARTAL

GRUPPE	MARKENNAME	PRIORITÄT	BEMERKUNGEN
Analgetica			
• Paracetamol	Panadol R	1. Wahl	Unbedenklich
• Ibuprofen	Brufen R	1. Wahl	Unbedenklich
• Diclofenac	Voltaren R	2. Wahl	Ibuprofen vorzuziehen
• Mefenaminsäure	Ponstan R, Mefenacid R	2. Wahl	Ibuprofen vorzuziehen
• Metamizol	Novalgin R	Als Reserve in Ausnahmefällen	Einzeldosen und befristet, wahrscheinlich unbedenklich wenn kurzzeitig gegeben (max. 48 Stunden)
•			
• Morphin		1. Wahl	
• Pethidin		2. Wahl	Höhere Konzentrationen in Muttermilch als Mo
• Clonidin	Clonidin R		Wenn möglich verzichten
Antiemetica			
• Pyridoxin	Itinerol R	1. Wahl	
• Odansetron	Zofran R	2. Wahl	
• Metoclopramid	Paspertin R	2. Wahl	
• DHBP			Nicht empfohlen, eine Einzeldosis scheint unbedenklich
Antacida			
• Ranitidin	Zantic R	1. Wahl	Lange Erfahrung im Vergleich zu Omeprazol
• Omeprazol	Pantoprazol R	2. Wahl	
Antihypertensiva			
• Nifedipin	Adalat R	1. Wahl	
• Labetalol	Trandate R	1. Wahl	
• Urbanil	Ebrantil R	1. Wahl	
• Dihydralazin	Nepresol R	1. Wahl	
• Amlodipin	Norvasc R		unsicher
• ACE Hemmer	Zestril R, Triatec R	2. Wahl	Lange in Anwendung und damit untersuchte Substanzen (Captopril=Lopirin R), Bezopril=Cibacen R) sollten vorgezogen werden. Sind in SS kontraindiziert!
• Angiotensin II Rezeptor Antagonisten	Cosaar R, Atacand R, Aprovel R		Sollten in der Stillzeit gemieden werden. In SS kontraindiziert

BLAU = UNBEDENKLICH

ROT = SOLLTE NICHT VERORDNET WERDEN, BZW. KONTRAINDIERT

Quellen: www.embryotox.de

U.S National library of medicine/TOXMED/LACTMED