

# GASTROSTOMIE ENDOSCOPIQUE PERCUTANÉE: SUIVI

## 1. Généralités

- Garder le lit impérativement pendant les 12 heures suivant la pose
- Surélever la tête de lit (30-400) : réduire le reflux et l'aspiration

## 2. Surveillance après l'intervention

- Contrôle du pouls et de la tension artérielle toutes les demi-heures au cours des 2 premières heures
- Puis une fois par heure au cours des 4 heures suivantes

## 3. Pansement

- Premier changement de pansement après 48 heures
- Au cours de la première semaine, changement quotidien, puis 2 à 3 fois par semaine.
- Nettoyage de la stomie avec H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, puis appliquer de la Betadine® en pommade
- Ne pas serrer trop fort le bouchon obturateur de la sonde de la sonde (risque de nécrose abdominale caverneuse)

## 4. Alimentation par sonde entérale

- Ne pas clamber la sonde GPE au cours des 12 à 24 premières heures
- Jeûne pendant 6 heures suivant la pose
- Ensuite, boire de petites quantités de tisane (commencer par 50 à 100 ml) 4 à 6 fois par jour (attention : risque de fuite en cas de quantités trop importantes)
- Augmenter progressivement au cours des premiers jours la quantité de liquide (à 400 à 500 ml)
- Commencer avec l'alimentation par la sonde après 24 heures

## 5. Nutrition entérale

- Surélever la tête de lit (30-400), garder cette position pendant 1 h après l'administration de l'alimentation entérale
- Après chaque administration, boire 30 à 50 ml de tisane (pas de tisane aux fruits) ou d'eau (pour éviter que la sonde ne se bouche)
- Médicaments:
  - uniquement sous forme liquide, et en dehors de l'administration de l'alimentation entérale
  - les antiacides à base d'aluminium ne doivent pas être administrés par la sonde (risque d'obstruction)