



SCHÉMA THÉRAPEUTIQUE POUR L'ŒSOPHAGITE À ÉOSINOPHILES

selon le Professeur Alex Straumann, Olten

ALTERNATIVE N°1: TRAITEMENT TOPIQUE PAR AXOTIDE DISKUS

• Mode d'emploi

- Conditionnement: 60 doses unitaires de 0,25 mg ou 0,5 mg
- Le boîtier doit être ouvert à l'aide d'un tournevis.
- Retirer la bobine avec les plaquettes

• Posologie

- Traitement initial pendant deux semaines
 - 2 x 1 mg (2 x 4 plaquettes d'Axotide 250 ou 2 x 2 plaquettes d'Axotide 500)
 - Avaler à sec la poudre de la plaquette en dose unitaire.
 - Matin/midi après le repas, ne pas manger ni boire pendant une heure après avoir pris la poudre, le soir, la prendre avant le coucher.
- Traitement d'entretien avec 2 x 250 mg (2 x 1 plaquette d'Axotide 250)

ALTERNATIVE N°2: TRAITEMENT TOPIQUE AVEC LE SIROP BUDESONID

• Composition

- Dissoudre Pulmicort Respules® 10-30 ml de sirop (teneur en sucre env. 60 %, action bactéricide)
 - Pulmicort Respules 0,5 mg/ml = 1 mg par ampoule
 - Pulmicort Respules 0,025 mg/ml = 0,5 mg par ampoule
 - Pulmicort Respules 0,0125 mg/ml = 0,25 mg par ampoule

• Posologie

- Traitement d'induction (durée de 2 semaines):
 - Env. 2 mg par jour, répartis en 2 ou 3 doses unitaires
 - Matin/midi après le repas, ne pas manger ni boire pendant une heure après avoir pris la solution, le soir, la prendre avant le coucher.
- Traitement d'entretien (long terme) : env. 0,5 milligrammes par jour, répartis en 2 ou 3 doses unitaires.